

آثار غلظت‌های مختلف عصاره بافت تخمدان بر تکوین فولیکول‌های پره آنترال موش پس از کشت سه بعدی

E | ^ " A E t ; Z ° ^ { } » | » Z u

%o Y , Y |, %o A i] e e °, ^ Z a . ^ k Y { e ^ , 1 # , Y Z A Z f l

%o Y %o YY ^ | o d i] , e ° ^ Z a . ^ k Y { e , , Z f ^ Y #

%o Y , %o Y %o Y a ^ e ^ » O | Y { Y , M ^ Z . ^ k Y { , Z f Y

t , e , , , ^ a # , , , 1 # ^ d j Y { e ^ Z . ^ k Y { f Y % f Y % f Y X | A , { M

Email: salehnim@modares.ac.ir

~ • Z < » , ~ a

~ • Z < » d § Z , {

^ | l ° q

| A / A e ... ^ ° i ^ i / ,] ^ | E Z d % E Y | Z i Z N d § Z] Y ^ - Z Z » f % A Y » Y Y
{ E]] ^ d E l W Y f % a Y » E Z ^

^ E Z d ^ / , i ^ i / , S % d A M e % b Y Z v b ^ Z - e | C ^ E Z % o Y] » z e Y d | S Z Y ^ Z { Y ^ »

- / Z a d / f l A l l M » / | { Z /] % o | / ^ . E Z f l ^ E Z % o A | : l Z g Y Y Z M M C o Z] Z Z
A X e ^ / ^ f i / , Z / ^ q ^ f i / , f i / E Z » , ,] M E Z d] , E Z A M E M

c] Y » , { A M ^ Z f E Z G a l v » ^ f l | ^ Z Z < » ^ Z d Y E Z Z e , ^ Z c m ^ V

% o » ^ A M ^ i . . p e ^ i Z ^ S i ,] % d Y , % o Y A l Z d Z R] ^ | Z { d f l

|] Z , % o Y f ^ a ^ p ^ . { Y f Y Z

^ E / Z u ^ ^ f {] ^ y S | ^ d % Y f ^ E Z d ^ E Z , Z f e f E Z d ^ R | I S Z d f f l

^ ^ ^ / Z < Z /] { | / % o { / E Z % o A X e ^ w a g A X e { ^ n a] » ^ | p { Z » % o Y | ... z e d §
t / % o A M J I E Z Z i /] . % o A X e ^ Z p ^ A q Z / Z u f l d g E l l f f g ... n » { % , Y

P ^ d Y { p f A f l ^ ^ f ^] d ^ e Y ^ m E Z % o P] Z ^ , Y S Y % o

P / » Z f i ^ / ,] % o W ^ / A .. z e d % o Y Z p ^ A q Z / Z u f l d g E l l f f g ... n » { % , Y

Z % o M { | / ^ Y . e ^ ^ K] s / i ,] ^ , p u ^ i % e S e p Y f Y Z N Y ^ h a Z E Z ^ E ,] ^ E l j ^ e

Y | / < Y ^ ^ O Z p ^ Z f / f l] { / A Y ^ i / { % Z Z Z Z / Y M Y d f l E Y ^] ^ | l P] g ^ f Y {

d Y ^ | ^ f S ^ f Z f l ^] ^ Z

d l A ^ * M , p l o ^ S Z Z » M d f l , % o Y % o Z k e Y d | S Z f l ^ Z

